

Équations de droites

1 Équation cartésienne d'une droite

Exercice 1

Soit E l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tel que $2x + y - 4 = 0$.

1. Trouver un exemple de point qui appartient à E .


Correction

On remarque par exemple que le point a ses coordonnées qui vérifient

2. Pour les différentes valeurs de x du tableau suivant, déterminer la valeur de y pour que le point de coordonnées $(x; y)$ appartienne à E .

x	-1	0	1	3	5
y tel que $2x + y - 4 = 0$					

3. Placer ses points dans le repère ci-dessous. Que remarque-t-on ?



Correction

On remarque que ces points sont Ils appartiennent à la droite représentant la fonction affine f , telle que pour tout x ,


Puisque $f(x)$ est une nous pouvons le remplacer par ce qui nous donne :

Définition 1

On appelle d'une droite d tout vecteur qui possède que la droite d .

Exercice 2

Donner les coordonnées de deux vecteurs directeurs différents de la droite tracée dans le repère ci-dessous.



Correction

Choisissons plusieurs points sur la droite. Le vecteur \vec{AB} est un vecteur directeur de la droite, ainsi que le vecteur \vec{AC} .

Considérons, par ailleurs, un point $M(x; y)$ de cette droite. Le vecteur \vec{AM} a pour coordonnées :

$$\vec{AM} = \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$$

Nous avons de plus, que \vec{AM} et \vec{AB} sont colinéaires. Ainsi :

Cette dernière égalité est à rapprocher de l'équation du premier exercice.

Définition 2

On appelle **vecteur directeur** d'une droite d tout vecteur \vec{u} qui possède la même direction que la droite d .

Propriété 1

Dans un repère orthonormé, les coordonnées de l'ensemble des points $M(x; y)$ d'une droite d vérifient une relation linéaire $ax + by + c = 0$ où a , b et c sont des nombres réels.

Preuve

Soient $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ et $M(x; y)$ trois points d'une droite d .

On a $\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{AM} = \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$.

Puisque ces points sont alignés, nous avons que \vec{AM} et \vec{AB} sont colinéaires. C'est-à-dire :

avec

Définition 3

La relation $ax + by + c = 0$ s'appelle **équation cartésienne** de la droite d .

Propriété 2

Soit d une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$. Le vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

Exemple 1

La droite d d'équation cartésienne $x - 2y + 2 = 0$ de l'exercice 2 a pour vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} -(-2) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2 Équation réduite d'une droite

Exemple 2

En reprenant la droite d'équation cartésienne $x - 2y + 2 = 0$, nous avons que :

On retrouve ici une expression proche d'une $ax + by + c = 0$ avec pour

Propriété 3

Soit d une droite d'équation cartésienne
Il existe un unique nombre m et un unique nombre p tels que

Définition 4

L'écriture $ax + by + c = 0$ s'appelle $ax + by + c = 0$ de d .
Le nombre m s'appelle a de d et p s'appelle b de d .


Propriété 4

- Toute droite d est à une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.
- Toute droite d est à une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.

Preuve

- Si d est horizontale alors le vecteur $\vec{v} = (1, 0)$ est un vecteur directeur.
Ainsi son équation réduite est de la forme : $y = c$ avec c donné. C'est-à-dire : $0x + 1y - c = 0$
- Si d est verticale alors le vecteur $\vec{v} = (0, 1)$ est un vecteur directeur.
Ainsi son équation réduite est de la forme : $x = c$ avec c donné. C'est-à-dire : $1x + 0y - c = 0$

Exemple 3



3 Positions relatives de deux droites

Propriété 5

Soient d et d' deux droites d'équations cartésiennes respectives

- Les droites d et d' sont \perp si et seulement si $a'a'' + b'b'' = 0$
- Les droites d et d' sont \parallel si et seulement si $a'a'' = b'b''$

Preuve

Les vecteurs $\vec{u} = (a, b)$ et $\vec{u}' = (a', b')$ sont des vecteurs normaux respectifs de d et d' .

On a :

Propriété 6

Soient d et d' deux droites d'équations cartésiennes respectives $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$.

Les coordonnées $(x; y)$ du point d'intersection de d et d' sont solutions

Propriété 7

Soient d et d' deux droites d'équations cartésiennes respectives $ax + by + c = 0$ et $ax + by + c' = 0$.

Les droites d et d' sont \parallel si et seulement si $c \neq c'$

Propriété 8

Deux droites sont sécantes si et seulement si elles ont un point commun